

補助テキスト

腹満 ・ 小腹

平成12年4月16日

佐藤至朗

腹滿

12 太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。陰弱者、汗自出。嗇嗇惡寒、浙浙惡風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。方一。

〔桂枝湯方〕

桂枝三兩 去皮 芍藥三兩 甘草二兩 炙 生薑三兩 切 大棗十二枚 擘

右五味、咬咀三味、以水七升、微火煮取三升、去滓、適寒溫、服一升。服已須臾、歎熱稀粥一升餘、以助藥力、溫覆令一時許、遍身熱微似有汗者益佳。不可令如水流離、病必不除、若一服汗出病差、停後服、不必盡劑。若不汗、更服、依前法。又不汗、後服小促其間、半日許令三服盡。若病重者、一日一夜服、周時觀之、服一劑盡、病證猶在者、更作服。若汗不出、乃服至二三劑。禁生冷、粘滑、肉麵、五辛、酒酪、臭惡等物。

太 上

〇 18

一八 喘家、作桂枝湯、加厚朴、杏子佳。六。 (厚朴杏仁各二〇)

33 六三 發汗後、不可更行桂枝湯。汗出而喘、無大熱者、可與麻黃杏仁甘草石膏湯。方二十六。

34 六四 發汗過多、其人叉手自冒心、心下悸欲得按者、桂枝甘草湯主之。方二十七。

35 六五 發汗後、其人臍下悸者、欲作奔豚、茯苓桂枝甘草大棗湯主之。方二十八。

〇 36 六六 發汗後、腹脹滿者、厚朴生薑半夏甘草人參湯主之。方二十九。

〔厚朴生薑半夏甘草人參湯方〕

厚朴半斤 炙 去皮 生薑半斤 切 半夏半斤 洗 甘草二兩 人參一兩

右五味、以水一斗、煮取三升、去滓溫服一升、日三服。

46 七六 發汗後、水藥不得入口、為逆。若更發汗、必吐下不止。發汗、吐下後、虛煩不得眠、

若劇者、必反覆顛倒、音到 冬切下同 心下懊懣、上烏洛下奴 梔子豉湯主之。若少氣者、梔子甘草豉湯主之。若嘔者、梔子生薑豉湯主之。三十八。

〔梔子豉湯方〕

梔子十四箇 擘 香豉四合 綿裹

右二味、以水四升、先煮梔子、得二升半、內豉、煮取一升半、去滓、分為二服、溫進一服、得吐者、止後服。

〇 49 七九 傷寒、下後、心煩、腹滿、臥起不安者、梔子厚朴湯主之。方四十一。

〔梔子厚朴湯方〕

梔子十四箇 擘 厚朴四兩 炙 去皮 枳實四枚 水浸 炙令黃

右三味、以水三升半、煮取一升半、去滓、分二服。溫進一服、得吐者、止後服。

7 一三四

太陽病、脈浮而動數、浮則為風、數則為熱、動則為痛、數則為虛。頭痛、發熱、微盜汗出、而反惡寒者、表未解也。醫反下之、動數變遲、膈內拒痛、一云頭痛即眩 胃中空虛、客氣動膈、短氣躁煩、心中懊懣、陽氣內陷、心下因鞅、則為結胸、大陷胸湯主之。若不結胸、但頭汗出、餘處無汗、劑頸而還、小便不利、身必發黃。大陷胸湯。方二。

〔大陷胸湯方〕

大黃六兩 去皮 芒消一升 甘遂一錢 匕

右三味、以水六升、先煮大黃、取二升、去滓、內芒消、煮一兩沸、內甘遂末、溫服

太 下

太 中

一升。得快利、止後服。

8 一三五 傷寒六七日、結胸熱實、脉沈而緊、心下痛、按之石鞭者、大陷胸湯主之。三。用前第 二方

10 一三七 太陽病、重發汗而復下之、不大便五六日、舌上燥而渴、日晡所小有潮熱、一云日晡所 發心胸大煩下至少腹鞭滿而痛不可近者、大陷胸湯主之。五。用前第 二方

29 二〇七 陽明病、不吐、不下、心煩者、可與調胃承氣湯。方一。

〔調胃承氣湯方〕

甘草二兩 炙 芒消半升 大黃四兩 清酒洗

右三味、切、以水三升、煮二物至一升、去滓、內芒消。更上微火一二沸、溫頓服之、以調胃氣。

30 二〇八

陽明病、脉遲、雖汗出不惡寒者、其身必重、短氣、腹滿而喘、有潮熱者、此外欲解、可攻裏也。手足濇然汗出者、此大便已鞭也、大承氣湯主之。若汗多、微發熱惡寒者、外未解也。一法與 桂枝湯其熱不潮、未可與承氣湯。若腹大滿不通者、可與小承氣湯、微和胃氣、勿令至大泄下。大承氣湯。方二。

〔大承氣湯方〕

大黃四兩 酒洗 厚朴半斤 炙 去皮 枳實五枚 炙 芒消三合

右四味、以水一斗、先煮二物、取五升、去滓。內大黃、更煮取二升、去滓。內芒消、更上微火一兩沸、分溫再服。得下、餘勿服。

〔小承氣湯方〕

大黃四兩 酒洗 厚朴二兩 炙 去皮 枳實三枚 大者 炙

右三味、以水四升、煮取一升二合、去滓、分溫二服。初服湯當更衣、不爾者盡飲之。若更衣者、勿服之。

31 二〇九 陽明病、潮熱、大便微鞭者、可與大承氣湯。不鞭者、不可與之。若不大便六七日、恐有燥屎、欲知之法、少與小承氣湯、湯入腹中、轉失氣者、此有燥屎也、乃可攻之。若不轉失氣者、此但初頭鞭、後必溏、不可攻之、攻之必脹滿不能食也。欲飲水者、與水則噦。其後發熱者、必大便復鞭而少也、以小承氣湯和之。不轉失氣者、慎不可攻也。

小承氣湯。三。用前第 二方

32 二一〇 夫實則讞語、虛則鄭聲。鄭聲者、重語也。直視、讞語、喘滿者死、下利者亦死。

33 二一一 發汗多、若重發汗者、亡其陽、讞語、脉短者死。脉自和者不死。

34 二一二 傷寒若吐、若下後不解、不大便五六日、上至十餘日、日晡所發潮熱、不惡寒、獨語如見鬼狀。若劇者、發則不識人、循衣摸牀、惕而不安、一云順衣妄 振搖不安微喘直視、脉弦者生、瀋者死。微者、但發熱讞語者、大承氣湯主之。若一服利、則止後服。四。用前第 二方

35 二一三 陽明病、其人多汗、以津液外出、胃中燥、大便必鞭、鞭則讞語、小承氣湯主之。若一服讞語止者、更莫復服。五。用前第 二方

〔厚朴大黃湯方〕

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

右三味、以水五升、煮取二升、分溫再服。

36 二四 陽明病、譫語、發潮熱、脉滑而疾者、小承氣湯主之。因與承氣湯一升、腹中轉氣者、更服一升。若不轉氣者、勿更與之。明日又不大便、脉反微濇者、裏虛也、為難治、不可更與承氣湯也。六。用前第一方

37 二五 陽明病、譫語、有潮熱、反不能食者、胃中必有燥屎五六枚也。若能食者、但鞭耳。宜大承氣湯下之。七。用前第二方

38 二六 陽明病、下血、譫語者、此為熱入血室。但頭汗出者、刺期門、隨其實而寫之、濇然汗出則愈。

39 二七 汗一作一作出譫語者、以有燥屎在胃中、此為風也。須下者、過經乃可下之。下之若早、語言必亂、以表虛裏實故也。下之愈、宜大承氣湯。八。用前第二方

41 二九 三陽合病、腹滿、身重、難以轉側、口不仁、面垢、又作枯一云向經譫語、遺尿。發汗、則譫語、下之則額上生汗、手足逆冷。若自汗出者、白虎湯主之。方九。

〔白虎湯方〕

知母 六兩 石膏 一斤 甘草 二兩 粳米 六合

右四味、以水一斗、煮米熟、湯成、去滓、溫服一升、日三服。

42 三〇 二陽併病、太陽證罷、但發潮熱、手足熱汗出、大便難而譫語者、下之則愈、宜大承氣湯。十。用前第一方

73 一〇三 太陽病、過經十餘日、反二三下之。後四五日、柴胡證仍在者、先與小柴胡。嘔不止、心下急、一云嘔鬱鬱微煩者、為未解也、與大柴胡湯、下之則愈。方五十三。

〔大柴胡湯方〕

柴胡 半斤 黃芩 三兩 芍藥 三兩 半夏 半升 生薑 五兩 枳實 四枚 大棗 十二枚

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煎、溫服一升、日三服。一方、加大黃二兩。若不加、恐不為大柴胡湯。

74 一〇四 傷寒十三日不解、胸脇滿而嘔、日晡所發潮熱、已而微利。此本柴胡證、下之以不得利、今反利者、知醫以丸藥下之、此非其治也。潮熱者、實也。先宜服小柴胡湯以解外、後以柴胡加芒消湯主之。五十四。

〔柴胡加芒消湯方〕

柴胡 二兩 黃芩 一兩 人參 一兩 甘草 一兩 生薑 一兩 半夏 二十枚 大棗 四枚 芒消 二兩

右八味、以水四升、煮取二升、去滓、內芒消、更煮微沸、分溫再服。不解更作。臣德等謹按、金匱玉函方中無芒消、別一方云、以水七升、下芒消二合、大黃四兩、桑螵蛸五枚、煮取一升半、服五合、微下即愈。本云柴胡再服以解其外、餘二升加芒消大黃桑螵蛸也。

60 二三八 陽明病、下之、心中懊憹而煩、胃中有燥屎者、可攻。腹微滿、初頭鞭、後必澹、不可攻之。若有燥屎者、宜大承氣湯。二十五。用前第一方

61 二三九 病人不大便五六日、繞臍痛、煩躁、發作有時者、此有燥屎、故使不大便也。

62 二四〇 病人煩熱、汗出則解。又如瘧狀、日晡所發熱者、屬陽明也。脉實者、宜下之。脉浮虛者、宜發汗。下之與大承氣湯、發汗宜桂枝湯。二十六。大承氣湯用前第二方桂枝湯用前第二十一方

○ 63 二四一 大下後、六七日不大便、煩不解、腹滿痛者、此有燥屎也。所以然者、本有宿食故也、

宜大承氣湯。二十七。用前第一方

○ 64 二四二 病人小便不利、大便乍難乍易、時有微熱、喘冒一作拂影不能臥者、有燥屎也、宜大承氣湯。

二十八。用前第二方

67 二四五 脉陽微而汗出少者、為自和也。一作如汗出多者、為太過。陽脉實、因發其汗出多者、亦為太過。太過者、為陽絕於裏、亡津液、大便因鞅也。

68 二四六 脉浮而芤、浮為陽、芤為陰。浮芤相搏、胃氣生熱、其陽則絕。

○ 69 二四七 跌陽脉浮而漻、浮則胃氣強、漻則小便數。浮漻相搏、大便則鞅、其脾為約、麻子仁丸主之。方三十一。

〔麻子仁丸方〕

麻子仁 二升 芍藥 半斤 枳實 半斤 大黃 一斤 厚朴 一尺 杏仁 一升
炙 炙 去皮 去皮 熬別作脂

右六味、蜜和丸如梧桐子大。飲服十丸、日三服、漸加、以知為度。

70 二四八 太陽病三日、發汗不解、蒸蒸發熱者、屬胃也、調胃承氣湯主之。三十二。用前第一方

71 二四九 傷寒吐後、腹脹滿者、與調胃承氣湯。三十三。用前第一方

○ 72 二五〇 太陽病、若吐、若下、若發汗後、微煩、小便數、大便因鞅者、與小承氣湯、和之愈。三十四。用前第二方

73 二五一 得病二三日、脉弱、無太陽柴胡證、煩躁、心下鞅。至四五日、雖能食、以小承氣湯、

少少與、微和之、令小安。至六日、與承氣湯一升。若不大便六七日、小便少者、雖不受食、一云大便但初頭鞅、後必漻、未定成鞅、攻之必漻。須小便利、屎定鞅、乃可攻之、

宜大承氣湯。三十五。用前第二方

○ 74 二五二 傷寒六七日、目中不了了、睛不和、無表裏證、大便難、身微熱者、此為實也。急下之、

宜大承氣湯。三十六。用前第二方

75 二五三 陽明病、發熱、汗多者、急下之、宜大承氣湯。三十七。用前第二方
云大柴胡湯

○ 76 二五四 發汗不解、腹滿痛者、急下之、宜大承氣湯。三十八。用前第二方

○ 77 二五五 腹滿不減、減不足言、當下之、宜大承氣湯。三十九。用前第二方

○ 78 二五六 陽明少陽合病、必下利。其脉不負者、為順也。負者、失也。互相剋賊、名為負也。脉滑而數者、有宿食也、當下之、宜大承氣湯。四十。用前第二方

81 二五九 傷寒發汗已、身目為黃、所以然者、以寒濕一作温在裏不解故也。以為不可下也、於寒濕中求之。

○ 82 二六〇 傷寒七八日、身黃如橘子色、小便不利、腹微滿者、茵陳蒿湯主之。四十二。用前第二十三方

83 二六一 傷寒身黃發熱、梔子檨皮湯主之。方四十三。

〔梔子檨皮湯方〕

肥梔子 十五箇 甘草 一兩 黃檨 二兩
炙 炙

右三味、以水四升、煮取一升半、去滓、分温再服。

12011

口 40 三三〇 少陰病、得之二三日、口燥咽乾者、急下之、宜大承氣湯。方十九。

〔大承氣湯方〕

枳實五枚 厚朴半斤去 大黃四兩 芒消三合

右四味、以水一斗、先煮二味、取五升、去滓、內大黃、更煮取二升、去滓、內芒消、更上火、令一兩沸、分溫再服、一服得利、止後服。

41 三三二 少陰病、自利清水、色純青、心下必痛、口乾燥者、可下之、宜大承氣湯。二十。

用前第十九方一法用大柴胡

42 三三三 少陰病、六七日、腹脹、不大便者、急下之、宜大承氣湯。二十一。用前第十九方

43 三三三 少陰病、脉沈者、急温之、宜四逆湯。方二十二。

五勞虛極、羸瘦腹滿、不能飲食、食傷、憂傷、飲傷、房室傷、飢傷、勞傷、經絡榮衛氣傷、內有乾血、肌膚甲錯、兩目黯黑、緩中補虛、大黃廔蟲丸主之。

〔大黃廔蟲丸方〕

大黃十分 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩 乾地黄十兩 乾漆一兩
廔蟲一升 水蛭百枚 蟻螬一升 廔蟲半升

右十二味、末之、煉蜜和丸小豆大、酒飲服五丸、日三服。

跌陽脉微弦、法當腹滿、不滿者必便難、兩胠疼痛、此虛寒從下上也。以温藥服之。

病者腹滿、按之不痛為虛、痛者為實、可下之。舌黃未下者、下之黃自去。

腹滿時減、復如故、此為寒、當與温藥。

病者痿黃、躁而不渴、胸中寒實而利不止者、死。

寸口脉弦者、即脇下拘急而痛、其人嗇嗇惡寒也。

夫中寒家喜欠、其人清涕出、發熱色和者、善嚏。

中寒、其人下利、以裏虛也、欲嚏不能、此人肚中寒。一云痛

夫瘦人繞臍痛、必有風冷、穀氣不行、而反下之、其氣必衝、不衝者、心下則痞也。

病腹滿、發熱十日、脉浮而數、飲食如故、厚朴七物湯主之。

〔厚朴七物湯方〕

厚朴半斤 甘草三兩 大黃二兩 大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩

右七味、以水一斗、煮取四升、温服八合、日三服。嘔者加半夏五合、下利去大黃、寒多者加生薑至半斤。

腹中寒氣、雷鳴切痛、胸脇逆滿、嘔吐、附子粳米湯主之。

〔附子粳米湯方〕

附子一枚 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 粳米半升

右五味、以水八升、煮米熟湯成、去滓、温服一升、日三服。

少陰

口 20

腹 2 腹 3

腹 9 腹 8 腹 7 腹 6 腹 5 腹 4

痛而閉者、厚朴三物湯主之。

〔厚朴三物湯方〕

厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚

右三味、以水一斗二升、先煮二味、取五升、內大黃煮取三升、溫服一升、以利為度。

按之心下滿痛者、此為實也、當下之、宜大柴胡湯。

〔大柴胡湯方〕

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升 枳實四枚 大黃二兩 大棗十二枚 生薑五兩

右八味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎溫服一升、日三服。

腹滿不減、減不足言、當須下之、宜大承氣湯。

〔大承氣湯方〕

大黃四兩 厚朴半斤 枳實五枚 芒硝三合

右四味、以水一斗、先煮二物、取五升、去滓、內大黃、煮取二升、內芒硝、更上火

微一二沸、分溫再服、得下、餘勿服。

心胸中大寒痛、嘔不能飲食、腹中寒、上衝皮起、出見有頭足、上下痛而不可觸近、大

建中湯主之。

〔大建中湯方〕

蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩

右三味、以水四升、煮取二升、去滓、內膠飴一升、微火煎取一升半、分溫再服、如

一炊頃、可飲粥二升、後更服、當一日食糜、溫覆之。

脇下偏痛、發熱、其脉緊弦、此寒也、以溫藥下之、宜大黃附子湯。

〔大黃附子湯方〕

大黃三兩 附子三枚 細辛二兩

右三味、以水五升、煮取二升、分溫三服、若強人煮取二升半、分溫三服、服後如人

行四五里、進一服。

〔外臺〕〔走馬湯〕 治中惡心痛腹脹、大便不通。

杏仁二枚 巴豆二枚

右二味、以綿纏槌令碎、熱湯二合、捻取白汁、飲之當下、老少量之。通治飛尸鬼擊

病。

問曰、人病有宿食、何以別之。師曰、寸口脉浮而大、按之反濇、尺中亦微而濇、故知

有宿食、大承氣湯主之。

脉數而滑者實也、此有宿食、下之愈、宜大承氣湯。

下利不欲食者、有宿食也、當下之、宜大承氣湯。

大承氣湯方 見前症 病中

腹23

宿食在上脘、當吐之、宜瓜蒂散。

〔瓜蒂散方〕

瓜蒂一分熬黃 赤小豆一分煮

右二味、杵為散、以香豉七合煮取汁、和散一錢匕、溫服之、不吐者、少加之、以快吐為度而止。亡血及虛者不可與之

跌陽脉浮而漻、浮則胃氣強、漻則小便數、浮漻相搏、大便則堅、其脾為約、麻子仁丸主之。

〔麻子仁丸方〕

麻子仁二升 芍藥半斤 枳實一斤 大黃一斤 厚朴一尺 杏仁一升

右六味、末之、煉蜜和丸梧子大、飲服十丸、日三、以知為度。

腎著之病、其人身體重、腰中冷、如坐水中、形如水狀、反不渴、小便自利、飲食如故、病屬下焦、身勞汗出、衣一作表裏冷濕、久久得之、腰以下冷痛、腹重如帶五千錢、甘薑苓朮湯主之。

〔甘草乾薑茯苓白朮湯方〕

甘草二兩 白朮二兩 乾薑四兩 茯苓四兩

右四味、以水五升、煮取三升、分溫三服、腰中即溫。

腹滿口舌乾燥、此腸間有水氣、已椒瀝黃丸主之。

〔防已椒目葶藶大黃丸方〕

防已 椒目 葶藶熬 大黃各一兩

右四味、末之、蜜丸如梧子大、先食飲服一丸、日三服、稍增、口中有津液、渴者加芒硝半兩。

水之為病、其脉沈小、屬少陰。浮者為風。無水、虛脹者為氣。水、發其汗即已。脉沈者、宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。

〔麻黃附子湯方〕

麻黃三兩 甘草二兩 附子一枚炮

右三味、以水七升、先煮麻黃、去上沫、內諸藥、煮取二升半、溫服八分、日三服。

黃家、日晡所發熱、而反惡寒、此為女勞得之。膀胱急、少腹滿、身盡黃、額上黑、足下熱、因作黑疸。其腹脹如水狀、大便必黑、時澹、此女勞之病、非水也。腹滿者難治。

消石礬石散主之。

〔消石礬石散方〕

消石 礬石燒等分

右二味、為散、以大麥粥汁和服方寸匕、日三服。病隨大小便去、小便正黃、大便正黑、是候也。

25

29

26

14

19

黃疸、腹滿、小便不利而赤、自汁出、此為表和裏實、當下之、宜大黃消石湯。

〔大黃消石湯方〕

大黃 黃蘗 消石各四兩 梔子十五枚

右四味、以水六升、煮取二升、去滓、內消更煮、取一升、頓服。

病人胸滿、唇痿、舌青、口燥、但欲嗽水不欲嚥、無寒熱、脉微大來遲、腹不滿、其人言我滿、為有瘀血。

病者如熱狀、煩滿、口乾燥而渴、其脉反無熱、此為陰伏、是瘀血也、當下之。

下利三部脉皆平、按之心下堅者、急下之、宜大承氣湯。

問曰、婦人年五十所、病下利數十日不止、暮即發熱、少腹裏急、腹滿、手掌煩熱、唇口乾燥、何也。師曰、此病屬帶下。何以故。曾經半產、瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口乾燥、故知之。當以溫經湯主之。

〔溫經湯方〕

吳茱萸三兩 當歸二兩 芍藥二兩 芎藭二兩 人參二兩 桂枝二兩 阿膠二兩 生薑二兩
牡丹皮二兩 甘草二兩 半夏半升 麥門冬一升

右十二味、以水一斗、煮取三升、分溫三服。亦主婦人少腹寒、久不受胎、兼取崩

中去血、或月水來過多、及至期不來。

〔三物備急丸方〕

大黃一兩 乾薑一兩 巴豆一兩
見千金。司空裴秀、為散用亦可、先和成汁、乃傾口中、令從齒間得入、至良驗。熬外研如脂。

右藥各須精新、先搗大黃、乾薑為末、研巴豆內中、合治一千杵、用為散、蜜和丸亦佳、密器中貯之、莫令歇。主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤、心腹脹滿、卒痛如錐

刺、氣急口噤、停尸卒死者、以煖水若酒服大豆許三四丸、或不下、捧頭起、灌令下咽、須臾當差、如未差、更與三丸、當腹中鳴、即吐下便差。若口噤、亦須折齒灌之。

張 3

婦 9

心 37

心 10

心 19

少腹

○ 76 一〇六 太陽病不解、熱結膀胱、其人如狂、血自下、下者愈。其外不解者、尚未可攻、當先解其外。外解已、但少腹急結者、乃可攻之、宜桃核承氣湯。方五十六。後云解外宜桂枝湯

〔桃核承氣湯方〕

桃仁五十箇 去皮尖 大黃四兩 桂枝二兩 去皮 甘草二兩 炙 芒消二兩
右五味、以水七升、煮取二升半、去滓、內芒消、更上火微沸、下火。先食温服五合、日三服、當微利。

○ 94 二三四

太陽病六七日、表證仍在、脉微而沈、反不結胸。其人發狂者、以熱在下焦、少腹當鞕滿、小便自利者、下血乃愈。所以然者、以太陽隨經、瘀熱在裏故也。抵當湯主之。方六十四。

〔抵當湯方〕

水蛭熬 各三十箇 去翅足熬 桃仁二十箇 去皮尖 大黃三兩 酒洗
右四味、以水五升、煮取三升、去滓、温服一升、不下更服。

95 二二五

太陽病、身黃、脉沈結、少腹鞕、小便不利者、為無血也。小便自利、其人如狂者、血證諦也、抵當湯主之。六十五。用前

○ 96 二二六

傷寒有熱、少腹滿、應小便不利、今反利者、為有血也、當下之、不可餘藥、宜抵當丸。方六十六。

〔抵當丸方〕

水蛭二十箇 筒熬 蟅蟲二十箇 去翅足熬 桃仁二十五箇 去皮尖 大黃三兩
右四味、搗分四丸。以水一升、煮一丸、取七合服之。晡時、當下血。若不下者、更服。

97 二二七

太陽病、小便利者、以飲水多、必心下悸。小便少者、必苦裏急也。

○ 19

〔崔氏〕〔八味丸〕 治脚氣上入、少腹不仁。

乾地黄八兩 山茱萸 薯蕷各四兩 澤瀉 茯苓 牡丹皮各三兩 桂枝 附子炮各二兩
右八味、末之、煉蜜和丸梧子大、酒下十五丸、日再服。
勞之為病、其脉浮大、手足煩、春夏劇、秋冬瘥、陰寒精自出、酸削不能行。

7

男子脉浮弱而澹、為無子、精氣清冷。一作冷

8

夫失精家、少腹弦急、陰頭寒、目眩、一作目暈 髮落、脉極虛芤遲、為清穀亡血失精。脉得諸芤動微緊、男子失精、女子夢交、桂枝龍骨牡蠣湯主之。

〔桂枝加龍骨牡蠣湯方〕 小品云、虛弱浮熱汗出者、除桂加白薇、附子各三分、故曰二加龍骨湯。

桂枝 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩
右七味、以水七升、煮取三升、分温三服。

10

〔天雄散方〕

天雄三兩 炮 白朮八兩 桂枝六兩 龍骨三兩
右四味、杵為散、酒服半錢匕、日三服、不知、稍增之。

11

男子平人、脉虛弱細微者、善盜汗也。

虛勞腰痛、少腹拘急、小便不利者、八味腎氣丸主之。方見脚氣中
寒疝腹中痛、逆冷、手足不仁、若身疼痛、灸刺諸藥不能治、抵當烏頭桂枝湯主之。

〔烏頭桂枝湯方〕

烏頭

右一味、以蜜二斤、煎減半、去滓、以桂枝湯五合解之、令得一升後、初服二合、不知、即服三合、又不知、復加至五合。其知者如醉狀、得吐者為中病。

〔桂枝湯方〕

桂枝三兩 去皮 芍藥三兩 甘草二兩 炙 生薑三兩 大棗十二枚

右五味、剉、以水七升、微火煮取三升、去滓。腸癰者、少腹腫痞、按之即痛、如淋、小便自調、時時發熱、自汗出、復惡寒。其脉遲

緊者、膿未成、可下之、當有血。脉洪數者、膿已成、不可下也、大黃牡丹湯主之。

〔大黃牡丹湯方〕

大黃四兩 牡丹一兩 桃仁五十枚 瓜子半升 芒消三合

右五味、以水六升、煮取一升、去滓、內芒消、再煎沸、頓服之、有膿當下、如無膿當下血。

產後腹痛、煩滿不得臥、枳實芍藥散主之。

〔枳實芍藥散方〕

枳實燒令黑 勿太過 芍藥等分

右二味、杵為散、服方寸匕、日三服、并主癰膿、以麥粥下之。

師曰、產婦腹痛、法當以枳實芍藥散、假令不愈者、此為腹中有乾血着臍下、宜下瘀血

湯主之、亦主經水不利。

〔下瘀血湯方〕

大黃二兩 桃仁二十枚 蟅蟲二十枚 熬去足

右三味、末之、煉蜜和為四丸、以酒一升、煎一丸、取八合、頓服之、新血下如豚肝。

產後七八日、無太陽證、少腹堅痛、此惡露不盡、不大便、煩躁發熱、切脉微實、再倍

發熱、日晡時煩躁者、不食、食則讞語、至夜即愈、宜大承氣湯主之。熱在裏、結在臍

臍也。方見瘧病中

帶下經水不利、少腹滿痛、經一月再見者、土瓜根散主之。

〔土瓜根散方〕

土瓜根 芍藥 桂枝 蟅蟲各三兩

右四味、杵為散、酒服方寸匕、日三服。

婦人少腹滿、如敦狀、小便微難而不渴、生後者、此為水與血、俱結在血室也、大黃甘

遂湯主之。

〔大黃甘遂湯方〕

大黃四兩 甘遂二兩 阿膠二兩

右三味、以水三升、煮取一升、頓服之、其血當下。

薬味薬能（新古方薬囊より）

桂枝	辛温	汗を発し表を調う、又衝逆を主どる
芍薬	苦平	結実して拘攣するを主治し傍ら腹痛、頭痛、身体不仁、咳逆、下利、腫膿を治す、結実とは凝りの事なり、拘攣引かれ引きつらるるを謂うなり、芍薬はよくたるみを引きしめ痛を除くの効あり、結実も拘攣も弛みより来るも見るべし
甘草	甘平	緩和を主として逆をめぐらす効あり、逆とは正に反する事なり、めぐるとは元に戻る事なり、故によく厥を復し消し痛を和らげ煩を治す
生薑	辛温	気を扶け外を実す
乾薑	辛温	深きを温むる効あり、故に厥を回し下利を止め嘔を治す
大棗	甘平	攣引強急を治す、攣引とはひきつり引かかる事なり、強急とはこはばりつまるなり、則ち大棗に緩和の効あるも見ゆ、又大棗には血の循りを良くするのハタラキあり
麻黄	苦温	よく表裏の水を逐う。故に汗を発し熱を解し喘を除き咳を鎮め、痛みを去り悪風寒を止どめ水気を消す。
厚朴	苦温	腹を温め腹満を除く。又胸満、咳、喘、上気等を治し、或は咽喉の塞えを治す。併しその根元は腹満にあり。
杏仁	甘温	よく腫を消し喘を定むといわる。其の本油分の緩和作用と芳香の発散作用とにあるは疑いなるべし。
附子	辛温	表を實し陽を益し津液を保つ故に悪寒を治し厥冷を復す。
烏頭	辛温	寒を逐い中を温む。故に寒疝腹中痛、歴節疼痛等を治す。
粳米	甘平	燥きを潤し急を緩め力を強むるの効あり。
人參	甘微寒	乾きを潤し、しぶりを緩む。故に心下痞、痞堅、身痛、下利、喜嘔、心痛、其の他を治す
白朮	苦温	水をさばきその滞りを除きよく小便を調う。故に小便不利、小便自利を治す。不利は出工合悪きをいう。又小便少ないも言う。自利はよく出る者を言う。則ち出過ぎる者の事、小便の出が悪い管なのに返って出の好い者の事も自利といふ小便が少なくて下利する者、小便の出が好くて便秘する者、筋や骨の痛む者、めまいのする者、頭の重い者、胃がふくて食進まず或は吐く者。
茯苓	甘平	水を収め乾きを潤しその不和を調ふ故に動悸を鎮め衝逆を緩下し水を利用して眩悸等を治す
芒硝	苦寒	燥けるを潤し熱を鎮め血行を能くするの効あり、ゆえに裏に熱ある諸病に用う。
大黄	苦寒	裏に熱ありて大便出でず便秘し又は下利するを治す。又腹痛、腹満を治す。或は内に熱あり、胃につかえありて治す。或は頭痛する者を治す
半夏	辛平	気を補い水を去る故によく嘔吐、腹中雷鳴、咳逆等を治す。又咽痛を治す、諸の胃の病、胸や脇のやまひ、咽喉のひ、又は咳嗽を伴う諸の病ひに用多し
黄芩	苦平	熱を和し熱より生ずる心下痞、下痢、腹痛、身熱等を治すること黄連の如し而かもこの場合心煩の証は著しから黄連は上部にゆくこと多く、黄芩は下部にゆく事多きものなり、またよく黄連に伍して用いられお互いその効を強むる事を為す。
細辛	辛温	中を温め、寒を去り、痛みを除き、痰を消し、咳嗽を治す。
澤瀉	甘寒	熱を去り燥きを潤すことをなす、故に刺激を緩和することを主る、その主目証は渴ありて水を欲するもの、冒眩あるもの、小便不利あるもの等なり。
梔子	苦寒	熱を去り胸中のもたえ苦しみを除き、或は心中の痛みを鎮め、又はのどの壅がりを開き、またよく不眠を治す
香薷	甘寒	胸心中の鬱熱を除くの効あり。
柴胡	苦平	半表半裏の熱を去る、故に胸脇苦満、胸中痛、心煩、往来寒熱、頸項強、脇下痞硬、心下満等を治す。
ヨウ花	苦寒	体中の水分を下し又小便を利することをも主ると云うべし。本品は小青龍湯の加減方中に用いられ微利する者とあり。然らば其の微利は体中の水分肌表に出づること能はざるを以て裏に迫りて此微利を起こすものなるべしヨウ花よく水を利して麻黄に代る者なり。
括呂根	苦寒	渴を主どる、又熱を消し小便を利し急を和す
括呂実	苦寒	味緩和にして血熱を除き燥きを潤し氣を通ず故によく胸脇部の疼痛を去り氣血の通行を滑らかにする
牡蛎	鹹平	乾きを潤し血氣の行を調へ和す、故に胸脇下のへを柔らげ或は寒瘡を治し或は水気を除き又は驚きを鎮むる等のなす。
龍骨	甘平	内を補ひ縮まりを緩め血氣を調へ和す、故に頭をやすめ氣を落付かせ疲労を治す
膠飴	甘温	急を緩め力を與う故によく裏急を治し腹痛を和す。
枳実	苦寒	熱をさまし、しこりを消すの効あり。又痛みをゆるめ腫をさる、故に諸の熱実病又は癰腫等を治す
桃仁	苦平	血の燥きを潤し滞りを通じ結を解く、故に血証薬として広く用いらる。
水蛭	鹹平	血を潤し血を柔らぐ故に蓄血悪血等を除くに用いらる、之れ生きたる蛭既に嚙傷より出づる血の凝結を妨げ流れしものを見て知るべし、故に乾物も亦よく血を結せしめざる効あるものならん。オケツとは病的に一処に滞りて流行しもの事を謂。
虻虫	苦微寒	血を逐い滞血を去る事を主る。故によくオケツを除く。本品と水蛭との効相似て同じからざる所あり、水蛭は血を潤し虻虫は血を走らす、これ水蛭とナラビ用いらるる所なるべし。
甘遂	苦寒	胸腹の溜飲を下す、故に之に由る短気、胸腹満、等を治す。短気は息切れの事を言うなり。
イルキ子	辛寒	辛は則ち肺に入り寒は則ち熱を除く故に肺氣虚し熱を持ちたる場合に肺中又は胸中に滞たる水を収め下すことをなす。故に喘息咳嗽呼吸困難等を治す。
蜜	甘平	よく緩め、よく潤おす。此潤おす所尤も蜜の勝れたる所なり。蜜煎導、烏頭湯、大烏頭煎等に用いられ又諸の丸薬を和るに用いらる。
桔梗	辛微温	咳を止め痰を去り、膿を消し痛みを鎮む。又よく咽痛を治す。此みな氣を増し氣の鬱滞を除くに基くものなり。
巴豆	辛温	辛は則ち氣を増し温は則ち氣を強む、巴豆に峻しき吐下の効あり、故に胸腹内に異常の停滞物ある時は之を除く事なる。
貝母	辛平	氣を増しカ滞を通ず故によく痰を去り小便を易からしむ。肺癰、小便難等を治するに用いらる。
羌花	辛温	氣を強めよく水を下だす故に蓄水に依る咳嗽、上気、喘、呼吸困難を治す。
大戟	苦寒	熱の為にさえぎられ滞りたる水を下すことを主どる、而してその能甘遂と相似たる所ありて小異あるもん如し、大根は地中に直入し甘遂の地中を横走す、恐らく人の体中に入りても此れに因みたる働きあるにあらざるや。
瓜蒂	苦寒	よく胸中の鬱熱を湧出するの効あり故に胸中に寒ありて吐せんと欲して吐す能わざる者を主る。
瓜弁	甘寒	胸中の微熱を除き通利をよくし燥きを潤し痛みを去ることを主どると。

赤小豆	甘平	こわばりを緩め水穀の行を利することを主とる。故によく大小便を利すことをなす之れ瓜蒂散、麻黄 ^{ソシヨウ} 赤小豆湯入る所以なり。
地黄	甘寒	血の熱を涼し出血を止どめよく肌肉を潤し養う
阿膠	甘平	肌肉の傷れを治し急を緩むることを主る。故に出血を止め煩を去る
麦門冬	甘平	咳を鎮め咽喉の通を好くし、熱を去る。特に虚弱者の咳込み、微熱等を除く効あり。
麻子仁	甘平	内熱によりて焼き固まれるを潤しやわらぐ
茵陳蒿	苦平	皮中の鬱熱を發することを主とる。故に黄疸を治す。
吳茱萸	辛温	胃中を温め其の働きを鼓舞す。故に停水を去り吐き気を治し下利を止どめ手足を温めまた頭痛を治す。
黄柏黄蘗	苦寒	血熱を去り、下利を止どめ、腹痛を治す。又黄疸を治す。何れも熱を除くが本薬の主とる所なり。
連 ^{ソウ} 猪胆汁	苦平 苦寒	ボク日連翹味苦平、熱を消し、黄を治し、鬱を除く、熱を除くが本薬の主効なるべし。熱を除き鬱を通じ生気を鼓舞回復せしむるの力あるものの如し。また此れを洗腸するによりてよく大便を出さしむ亦鬱を通ずる力あるものに由る如し。
当归	甘温	中を緩め外の寒を退け気血の行りをよくすることを主とる。故に手足を温め、腹痛を治し、内を調え血を和し胎を安ず、之れ当归の好んで婦人血の道の諸病、諸の冷え込み等に用いらるる所以なるべし
蜀椒	辛温	腹中を温め腹痛を治す。又腹中の虫を殺す力ありと言う。
椒目	辛平	燥けるを湿おし気を通じ腹中の水を去るのほたらきあるべしと。
通草	辛平	気を通じ血を循らし、よく手足を煖む。故に当归四逆湯に配伍せられ、手足の厥寒を治するに用いらる。
升麻	甘平	咽喉の痛みを直し治し唾血を止む
いずい	甘平	不足を補い中を和す。故に咽喉を調え泄利をいやす。顔のおもくさを除くも恐らく此の理によるものなるべし
商陸	辛平	強き利水の効あり。故によく水腫を除く。
防已	辛平	気を増し外部に在る水を利す、故に風水、皮水、を治し身重きを主る。防已を用うる所身重に重きを置くべし。
葶蟲	鹹寒	血を治す。特に其の結したるものを解く効あるが如し。
瞿麦	苦寒	小便を利し水腫を去る。又よく刺を抜き膿を出だすの効ありと言わる。
牡丹皮	辛寒	内の熱を散じ結滯を浄め消するの効あり。
防風	甘温	風を去り疼痛を治す。其の効当归に似て少しく異なる所あるものに似たり。
羌活独活	辛温	気のみぐりを良くししのぼせを下げ頭を軽くし腹痛を治し月経不順を調え又は下血を止どめ或は胎児を安んず、 ^{キョウ} は当归と合用せられ諸種の婦人病、昔時の所謂血の道に応用せらる此れ等は皆気の滞りを散じ血行を順にさせる思われます。
薯蕷	甘温	中の傷れを補い腰より下を下を温むるの効あり一種の強壯薬として用いらる、腰痛を治し小便を調う。
山茱萸	酸平	小便の自利を止め不利を出し少腹を引きしめ視力を益す等の効ありとなす。
ヒソク	鹹微温	血を治むる効あり、故に ^{ソウ} 大黃 ^{ソウ} 蟲丸中に入る。
乾漆	辛温	ただれを愈やし湿りを乾かし悪瘡を治し労を補うと。故に乾漆は ^{ソウ} 大黃 ^{ソウ} 蟲丸に配伍せられ諸の癩及び皮膚甲錯をるに用いらる、 ^{ソウ} 大黃 ^{ソウ} 蟲丸の方は ^{ソウ} 蟲の部に在り。
冬瓜子	甘平	刺激を緩和し痛みを痛みを鎮むるの効あり。
土瓜根	苦寒	熱を去り熱を去る。故によく導をなし又陰 ^{ソウ} 腫を治す。

	水蛭	全虫	桃仁	大黄	冲虫	土瓜根	甘草	路路	桂枝	芒硝	牡丹	蘇	桂	木	棟	壁	錢		
桃核承氣湯			1.2	2.4			1.2		1.2	1.2									
抵当湯	1.8	2.0	2.4	3.0	200 →120	→40													
抵当丸(4丸分)	1.2	1.4	1.4	3.0	170 40→28	→28													
八二末丸	山慈艾4.0	薯蕷4.0	1.2	3.0	附子1.0				1.0		3.0		1.0				8.0		
桂枝加噎蟻																			
烏頭桂枝湯																			
硝石礬石散																			
大黃牡丹湯			2.0	4.0		冬瓜子2.0				4.0	1.0								
下血湯			2.4	3.0	6.0	170 40→32													
大承氣湯				4.0	厚朴8.0	枳實3.5				4.2									
土瓜根散					3.0	3.0						3.0	3.0						
大黃甘遂湯		甘遂2.0	阿膠2.0	4.0															
大黃沖氣丸	6.0	1.3	10.0	2.5	2.0	黃芩2.0	3.0	4.0				4.0	10.0	1.3			10.0		

桂枝加厚朴杏子湯	3	3	12枚 4	3	2		2			2				
厚朴姜糖甘草人參湯	半斤 5			半斤 8	2		半斤 8							
梔子厚朴湯							4	4枚 2.8			14個 1.4			
大陷胸湯						6			-4			-1枚		
小	半斤 5					黃連 1			枳實 1枚					
大承氣湯						4	半斤 8	5枚 3.5		3合 4.2				
小承氣湯						4	2	3枚 2.1						
柴胡加芒硝湯	半斤 5		4枚	1	1				2	柴胡 2.16	黃芩 1	人參 1		
麻子仁丸	麻子 16	2升	半斤 8			1斤 16	-R 10	半斤 8		1升 10				
茵陳蒿湯						2		茵陳 6			14枚			
大黃汁虫丸	地黃 10	7			2	十分 2.5				1斤 13	黃芩 2		1斤 10.0	乾薑 1 14 10枚
厚朴七物湯	2		10枚	5	3	2	半斤 8	5枚 3.5						地黃 14 半斤
厚朴三物湯						4	8	5枚 3.5						
厚朴大黃湯						6	1斤 10	4枚 2.8						
走馬湯										2枚	巴豆 2個			
巴椒蘆葦丸			葶藶 1	椒目 1	附子 1	1								
麻黃附子湯														
消石礬石散								礬石 10	消石					
大黃消石湯						4			消石 4		15枚	黃柏 4		
溫經湯														
三物備急丸				乾姜 1		1						巴豆 1		
調承氣湯					2	4			半斤 8					